

## Sünnet hakkında bilgiler

Sayın Veli,

Bugün çocuğunuz narkoz altında ambulatant şeklinde ameliyat oldu.  
Çocuğunuzun evdeki bakımı için size bu bilgileri okumanızı tavsiye ederiz.

- 1.) Eve geldiğinizde çocuğunuza su (asitsiz) , bitkisel çaylar içirebilirsiniz. İçirmemeniz gereken sular örneğin: Meyve suyu, Cola, Fanta türleri. Eğer su ictiğinde miğdesi bulanmaz ve istifra etmezse bisküvi, ekmek veya peksimet yedirebilirsiniz. Yemekten sonra çocuğunuz istifra ederse, yaklaşık bir saat sonra yalnızca çay veriniz.
- 2.) Ameliyattan beş gün sonra çocuğunuzun fazla hareket etmemesine dikkat edin, örneğin: Parkta, kum içerisinde oynamamak, zıplamamak, yüzmek, spor dersine katılmamak ve uzun araba yolculuğu yapmamak gibi. Yaranın ilti hap kapmaması için bunlardan sakınınız. Ana okuluna veya ilkokula beş gün sonra gidebilir, ama yetkili öğretmene sünnetten bahsediniz ki, çocuğunuza dikkat ve itina gösterebilirsiniz.
- 3.) Yara bakımı, çoğunlukla çocuklara pansuman bezi takılmadan eve gönderiliyor. Ameliyatın ilk günü tedavi uygulanmıyor. Çocuğunuz evde fazlasıyla yatsın ki yarası azıp şişmesin. Ameliyatın ertesi günü veya ikinci günü yaranın kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlara yetkili olan doktorlar ise ev doktoru, çocuk doktoru veya bir Urologdur. Yaranın iyileşmesinde bir sorun yoksa, günde iki kere papatya banyosu yaptırılabilir (papatya çayını banyo suyuna karıştırabilirsiniz). Lütfen ameliyat yerinin üzerine hiç bir krem türü sürmeyiniz. Eğer iç çamaşırına yapışıyor derseniz Panthenol Kremi kullanabilirsiniz. Pudra türleri kesinlikle yasak. Bol pantolon veya eşofman giymelerini tavsiye ederiz. Çocuğunuz bez kullanıyorsa sık sık bezini değiştirin ve gerekiyorsa poposunu sadece ılık suyla yıkayayın.
- 4.) Acil durumlarda: Çocuğunuzun ateşi çıkarsa, kanaması olursa, ameliyat yeri şişerse, veya çok ağrısı olursa her an, gündüz veya gece, hafta içi veya hafta sonu bizi, **Acil ambulans arayabilirsiniz** (Bergmannsheil, Altkat), ve bir Urolog ile konuşabilirsiniz. İsterseniz çocuğunuzunuzu alıp acile gelin ve size anında yardım edilsin. Hastanın az ağrısı olursa Paracetamol fitili veya Ibuprofen şurubu içirebilirsiniz. Çocuğunuza kesinlikle Aspirin vermeyin çünkü kanamayı yükseltir. Kısa zamanda üç kez ağrı kesici vermek zorunda kalırsanız hemen hastaneye getirin. Kontrol altına alınması gerekiyor. Çocuğunuzun sürekli olarak miğdesi bulanırsa, ateşi 39°C yüksek olursa, çok uyur veya baygınlık geçirirse veya nefes almakta zorlanırsa acilen hastaneye getirin. Ateşini poposundan ölçtüğünüzde 38,5°C olursa normal, tedaviye ihtiyaç yoktur. İç çamaşırına az kanama geçerse meraklanmayın, çocuğunuzun yatıp istirahat etmesini sağlayın. İki haftaya kadar yarasının şişkinliği iner. Yaranın etrafında morluklar oluşursa kısa zaman sonra yok olurlar. Bu saydıklarımız uzun süre kaldığı takdirde doktora görünmesi tavsiye edilir. Dikişler 10-20 gün içerisinde kendiliğinden düşer.

Güvenceniz için Teşekkür ederiz.  
Çocuğunuza geçmiş olsun.

**Yara kontrolü:**  
(Datum Nachkontrolle)

**Saat:**  
(Uhrzeit)

**Yer:**  
(Ort)